

## ※予防接種後副反応報告書集計報告に見る死亡報告

厚生省HPに公開されている1996（平8）年～2009（平21）年（Hib・PCVが導入されるまで）の14年間の死亡報告は28件。年平均2件。2010年より同時接種後を含め死亡報告が増えた。副反応検討部会に死亡報告としてまとめられたものは2011年～の約14年間にHPVを含め150件。年平均10.7人。

予防接種後副反応報告 死亡報告（高齢者のインフルエンザ除く）

	DPT・DT	DPT-IPV	ポリオ	不活化ポリオ	MR	麻しん	風しん	日本脳炎	BCG	Hib	PCV	
2013（平25）	2	4	/	0	2	0	0	1	0	4	3	16
2012（平24）	2	2	/	1	1	0	0	2	0	/	/	8
2011（平23）	5	/	1	/	0	0	0	0	2	/	/	8
2010（平22）	6	/	0	/	0	0	0	0	1	/	/	7
2009（平21）	0	/	0	/	0	0	0	0	0	/	/	0
2008（平20）	1	/	0	/	0	0	0	0	0	/	/	1
2007（平19）	0	/	0	/	0	0	0	0	0	/	/	0
2006（平18）	0	/	0	/	0	0	0	0	0	/	/	0
2005（平17）	1	/	0	/	/	0	0	0	0	/	/	1
2004（平16）	0	/	0	/	/	0	0	0	0	/	/	0
2003（平15）	1	/	0	/	/	2	0	0	0	/	/	3
平8～平14（7年間）	5	/	10	/	/	3	0	4	1	/	/	23
平8～平21（14年間）	8	/	10	/	/	5	0	4	1	/	/	28

日本脳炎：平成17年（2005）5月30日積極的接種勧奨差し控え（5年間）

- 2013 ①1歳6か月男児：DPT・Hib同時接種した翌日、感冒様症状、40℃第発熱。接種から2日後呼吸停止状態で発見。  
 ②1歳7か月男児：DPT・Hib同時接種。自宅到着後母親が異変に気づき、接種医療機関へ。心肺停止。  
 ③9か月男児：DPT-IPV接種5日後、うつぶせで呼吸をしていないことに家族が気づき救急搬送。  
 ④6か月女児：DPT-IPV接種2日後、嘔吐のため救急搬送。帰宅後白色水様便、再受診の車中で全身症状悪化。死亡確認。  
 ⑤5か月女児：DPT-IPV接種翌日、腹臥位で呼吸停止となっているのを父親発見。  
 ⑥6か月男児：DPT-IPV・BCG・B型肝炎・ロタ同時接種した翌日、腹臥位で呼吸停止となっているのを母親が発見。司法解剖所見で肺胞内の食物残渣がみとめられ、嘔吐による窒息が原因と推定。  
 ⑦18歳7か月男性：MR接種3日後、心肺停止状態であることを入所施設職員が発見。  
 ⑧1歳3か月女児：MR接種13日後発熱。接種17日後発熱熱性けいれん。発熱持続。19日後心肺停止しているのを母親が発見。  
 ⑨3歳1か月女児：日本脳炎接種5日後、発熱。受診して帰宅。翌日未明、腹臥位で心肺停止状態で発見。ADEMと判明。  
 ⑩3か月女児：Hib・PCV・ロタ同時接種した夜からやや多呼吸、翌日4回の嘔吐、受診。全身性強直性痙攣が出現、心肺停止。  
 ⑪6か月男児：Hib・PCV同時接種した3日後、自宅で心肺停止の状態で見つかる。死亡画像診断で脳浮腫、気管支に貯留物を認めた。  
 ⑫2か月女児：Hib・PCV同時接種翌日、横臥位で無呼吸の状態の児に母親が気づき救急搬送。  
 ⑬2か月男児：Hib・PCV・B型肝炎・ロタ同時接種2日後に死亡が確認された。解剖施行されたが、明らかな死因特定に至らず。  
 ⑭1歳男児：PCV・MR同時接種した2日後、嘔吐・発熱、解熱剤使用。接種から4日後の朝、心肺停止の状態で見つかる。  
 ⑮2か月男児：PCV・Hib同時接種翌日、仰臥位で、呼吸なく、冷たくなっている状態で発見。  
 ⑯2か月男児：Hib・PCV同時接種してから3日後、心肺停止の状態で見つかる。RSウイルス迅速検査陽性。
- 2012 ①5か月男児：DPT・Hib・PCV同時接種。接種後13日、うつぶせ呼吸停止状態で発見、救急要請。剖検あり。  
 ②3か月女児：DPT接種2時間後、息苦しそうになり呼吸停止したため救急要請。剖検、両肺全域肺炎所見、ウイルス性心筋炎の可能性。  
 ③7か月男児：DPT-IPV接種翌日、異変に気づき救急要請。SIDS疑い。  
 ④3か月男児：DPT-IPV・Hib・PCV・ロタ同時接種。接種翌朝呼吸停止。  
 ⑤6か月女児：不活化ポリオ・DPT・Hib・PCV同時接種。接種5時間後に冷たくなっているのを発見。  
 ⑥1歳6か月男児：MR接種3時間後、発熱。接種翌日全身性痙攣のため救急搬送。接種2日後急性脳症、DIC診断。多臓器不全進行し死亡。  
 ⑦：日本脳炎接種翌日感冒症状あり。接種3日後熱性けいれん重積にて入院。入院4日後、DICと多臓器不全認め、接種7日後死亡。死因は急性脳症。  
 ⑧10歳男児：日本脳炎接種4・5分後、心肺停止状態で発見され救急要請。
- 2011 ①5か月女児：DPT一期初回1回目接種後5日目、うつぶせ寝状態で心肺停止にて発見。剖検あり。SIDS診断。  
 ②5か月男児：DPT一期初回1回目・BCG同時接種、接種当日自宅にて心肺停止。基礎疾患左心形成症候群あり。（⑧と同一か）

- ③4か月女児：1週間前にHib接種。**DPT一期初回2回目・PCV同時接種**、1週間後BCG接種時診察にて心筋炎診断。入院後死亡。
- ④6か月女児：DPT一期初回3回目接種翌日、死亡。
- ⑤5か月女児：**DPT一期初回1回目・Hib同時接種**。3日後発汗、呼吸状態悪化にて緊急入院。その後死亡。
- ⑥：ポリオ接種後、SIDS死亡。
- ⑦3か月：BCG接種後7か月でリンパ腫、肺炎、汎血球減少症診断。その後全身性発疹、患部からBCG菌証明。全身性播種性BCG感染症。接種後12か月、呼吸不全のため死亡。
- ⑧5か月：**BCG・DPT同時接種**、数時間後に睡眠中呼吸停止。左低形成症候群を持っていた。（②と同一か）
- 2010 ①：BCG接種後死亡例一覧表のみ掲載。
- ②4か月女児：DPT一期初回接種の翌朝、突然顔色不良となる。救急隊到着時心肺停止。搬送先病院で救命措置するも死亡。
- ③7か月男児：**DPT・Hib同時接種**、7日後、うつぶせで心肺停止状態で発見。解剖所見からSIDSとされた。
- ④5か月女児：**DPT・Hib同時接種**2日後の夜から頻呼吸を認め、接種から3日後の深夜、呼吸の異常を認めた。その後呼吸停止。解剖所見から死因は急性循環不全とされた。
- ⑤1歳女児：**DPT・PCV同時接種**の当日深夜から高熱。翌日うつ伏せで呼吸停止状態で発見。患者の咽頭ぬぐい液からヒトメタニューモウイルスがPCR検査により同定され、急性感染症による死亡の可能性が示唆された。
- ⑥3か月女児：**DPT・Hib・PCV同時接種**、3日後に死亡。
- ⑦6か月女児：**DPT・Hib・PCV同時接種**の翌日昼、顔色異常、眼球上転、意識消失の後死亡。解剖所見から、死因はシャント血栓症による循環不全の疑いとされた。
- ※ ②は予防接種健康被害救済申請に係る審議において、ワクチン接種との因果関係は否認されている。
- ※ ③～⑦は子宮頸がん等ワクチン接種後副反応検討委員会に置いて「ワクチン接種と死亡との間に、直接的な明確な死亡との因果関係
- 2008 ①1歳6か月女児：DPT接種翌日より38°Cの発熱、痙攣（眼球拳上）チアノーゼ出現、入院。当日午後呼吸不全にて死亡。他の疾患は考えられず。
- 2005 ①8か月女児：DPT一期3回目接種後10日目より発熱、夜間自宅にて心肺停止に気づく。剖検なし。心筋炎診断。この症例とワクチンとの因果関係はないものと思われる。
- 2003 ①：DPT接種後死亡例一覧表のみ掲載。
- ②1歳11か月男児：麻しん接種後7日目に38°C台の発熱。接種後11日目に死亡。基礎疾患症候性でんかん
- ③：麻しん接種後死亡例は一覧表では2件になっている。